



Общество с ограниченной ответственностью «СоноМед»

Адрес: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Степана Разина, д. 2М
ИНН: 5246048629, КПП: 524601001, БИК: 042202603, Р/С: 40702810342000028624,
К/С: 30101810900000000603, Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород.
Тел.: +7 (83159) 9–20–22, Веб-сайт: www.bor-ultra.ru E-mail: info@bor-ultra.ru

Подготовка к ФГДС

1. Найти предыдущие исследования и выписки из стационаров
2. Приготовить с собой большое полотенце
3. Пациентам с Бронхиальной астмой взять с собой ингалятор.
4. Пациентам с диабетом разрешается, при необходимости, сахар под язык.
5. **За 8 часов** прекратить прием любой пищи
6. **За 2 часа** прекратить прием любой жидкости

Подготовка к колоноскопии

ПОДГОТОВКА К ОБСЛЕДОВАНИЮ с препаратом ЛАВАКОЛ /ФОРТРАНС/ ЭЗИКЛЕН

При подготовке с препаратом Лавакол потребуется 15 пакетиков,

Фортранс потребуется 4 пакетика.

ЗА 4 ДНЯ ДО ИССЛЕДОВАНИЯ СОБЛЮДАЕТСЯ БЕСШЛАКОВАЯ ДИЕТА — ЭТО ЛЕГКОУСВОЯЕМАЯ РАФИНИРОВАННАЯ ПИЩА, ПОЧТИ НЕ СОДЕРЖАЩАЯ НЕПЕРЕВАРИВАЕМЫХ ВЕЩЕСТВ.

ЧТО МОЖНО

Мучные изделия и каши: крекеры (без добавок, кунжута и мака), овсяная каша;

Молочные продукты: нежирный творог, сыры, натуральный йогурт (без добавок), не более 2-х стаканов обезжиренного молока;

Супы: супы на нежирном бульоне;

Мясо: хорошо приготовленные блюда из нежирной говядины, телятины; курица в отварном виде, также в виде котлет, фрикаделек;

Рыба: блюда из трески, судака, окуня, щуки (нежирные сорта рыбы);

Фрукты и напитки: чай, некрепкий кофе, компоты, кисели, соки (прозрачные, без мякоти, сухофруктов, ягод, зерен!);

Сладкое: сахар, мед, желе, сироп.

ЧТО НЕЛЬЗЯ

Мучные изделия и каши: черный и белый хлеб, все зерносодержащие продукты (цельное зерно, продукты с содержанием размельченных зерен, орехов, мака, кунжута, кокосовой стружки и т.д.);

Молочные продукты: йогурт, содержащий наполнители (кусочки фруктов и ягод, мюсли), пудинг, сметана, мороженное, жирный творог;

Супы: щи и борщ, молочные супы, крем-супы, окрошка;
Мясо: жирные сорта мяса, утка, гусь, копчености, колбасы, сосиски;
Рыба: жирные сорта рыбы (сельдь, скумбрия, форель, лосось);
Овощи: все свежие овощи (помидоры, огурцы, свекла), капуста в любом виде, все разновидности зелени (петрушка, укроп, салат, кинза);
Фрукты: все фрукты (яблоки, груши, киви, виноград), ягоды, сухофрукты (изюм, чернослив, курага);

Напитки: алкогольные напитки, квас, газированная вода, напитки из сухофруктов;
Приправы и консервы: острые приправы (хрен, перец, горчица, лук, уксус, чеснок); приправы с зернами, травами, соленья, консервы, соленые и маринованные грибы, морские водоросли.

НАКАНУНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЧТО МОЖНО

В течение дня можно пить только прозрачные жидкости в неограниченном количестве: прозрачный бульон, зеленый чай, прозрачные соки без мякоти, кисель без ягод и зерен, негазированная вода. Употреблять твердую пищу нельзя.

Процедура назначена до 12.00:

ПОДГОТОВКА ЛАВАКОЛОМ:

С 17.00-22.00 прием ЛАВАКОЛА 15 пакетов.

Раствор препарата готовится из расчета: Лавакол 5 пакетиков на 1 литр воды

Раствор пить постепенно: по 1 литру в течение часа, по 250 мл каждые 15 минут.

Примерно через 1 час после начала приема раствора Лавакол появится жидкий стул, не сопровождающийся болезненными ощущениями.

Опорожнение кишечника завершится через 1-2 часа после приема последнего пакетика ЛАВАКОЛА.

ПОДГОТОВКА ФОРТРАНСОМ:

Раствор препарата готовится из расчета: Фортранс 1 пакетик на 1 л воды.

Раствор пить постепенно: по 1 литру в течение часа, по 250 мл каждые 15 минут, через 2 часа после последнего приема пищи.

Примерно через 1 час после начала приема раствора Фортранс появится жидкий стул, не сопровождающийся болезненными ощущениями.

Для полного опорожнения кишечника необходимо выпить 4 литра раствора: С 15.00 до 19.00 выпить, С 21.00 появится жидкий стул

ПОДГОТОВКА ЭЗИКЛЕНОМ:

Схема двухэтапного приема препарата (если колоноскопия назначена на первую половину дня)

Прием первой дозы- день накануне колоноскопии: раствор препарата 0,5л выпить медленно в течении 30-60 минут, затем разрешенная жидкость 1 литр. Прием второй дозы- утром в день колоноскопии за 4 часа до начала проведения КСК : раствор препарата 0,5 л выпить медленно в течении 30-60 минут, затем 1 л разрешенной жидкости.

Схема одноэтапного приема препарата (если колоноскопия назначена на вторую половину дня)

Прием первой дозы препарата утром в день колоноскопии за 8 часов до начала проведения КСК

Прием второй дозы препарата в день проведения колоноскопии за 4 часа до начала проведения КС.

ПРОВЕДЕНИЕ КОЛОНОСКОПИИ ПОД СЕДАЦИЕЙ

Список анализов

- 1. Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, тромбоциты, эритроциты , ЦП**
- 2. Общий анализ мочи**
- 3. Гемостазиограмма скрининг**
- 4. АлАт**
- 5. АсАт**
- 6. Билирубин общий**
- 7. Общий белок**
- 8. Креатинин**
- 9. Глюкоза**
- 10. Группа крови и резус-фактор**
- 11. Электрокардиограмма**
- 12. RW**
- 13. ВИЧ**
- 14. Гепатит В и С**
- 15. ФЛГ**